


# מאור

## מתמטיקה אוריינית בחטיבת ביניים



### מדידת טמפרטורה בסולמות שונים

המשימה קיימת ב – 3 רמות



©

בל האזיות ש שמורות ל  
ליין ר. וצוט מאור, אוניברסיטת חיפה

אין להעתיק, לצלם או לשכפל חוברת זו  
או קטעים ממנה בשום אמצעי

פרטי התקשרות:

[maor@labs.edu.haifa.ac.il](mailto:maor@labs.edu.haifa.ac.il)

04-8288351



## תעודת זהות של המשימה


פונקציה לינארית	נושא מתוכנית הלימודים לשילוב המשימה
ביתה	ח'
זמן נדרש ליישום המשימה (עד 45 דקות)	זמן נדרש ליישום המשימה (עד 45 דקות)
<p>האחדה בין שלושה היבטים של הפונקציה הקווית: פונקציה שבה קבוע ההשתנות הוא אחד, פונקציה שהגרף שלה הוא קו ישר, ופונקציה שהיצוג האלגברי שלה הוא מהצורה: <math>b + ax = y</math></p> <p>מציאת ייצוג אלגברי של פונקציה קווית בהינתן ערכיה בשתי נקודות</p>	
<p>האחדה בין שלושה היבטים של הפונקציה הקווית: פונקציה שבה קבוע ההשתנות הוא אחד, פונקציה שהגרף שלה הוא קו ישר, ופונקציה שהיצוג האלגברי שלה הוא מהצורה: <math>b + ax = y</math></p> <p>מציאת ייצוג אלגברי של פונקציה קווית בהינתן ערכיה בשתי נקודות</p>	
<p>זהוי קשר בין פונקציה לינארית לבין שני משתנים.</p> <p>מציאת ביטוי אלגברי לפונקציה לינארית על פי שתי נקודות או שיפוע ונקודה.</p>	
מדידת טמפרטורה בסולמות שונים: מעלה צליזס, מעלה פרנהייט ובקליון. הבנת המושג אפס מוחלט.	אוריינית קונספטואלית
פתרונות בעיות המתארות תהליכי השתנות באמצעות פונקציה קווית.	ידע ומומנויות שהמשימה יכולה לקדם



בעיית הקובעים נועדה לעורר סקרנות אצל התלמידים. יש להציגו לפני הכל הכתיבה לפני תיאור הסיטואציה. לא הכרחי לעונת עליה. בסוף ניתן לחזור לשאלה זו.  עבודה בקבוצות של 2-4 תלמידים.  לפתרון בעיות 2 ו 3 ניתן להיעזר בישום מודולרי.  ניתן לבקש מהתלמידים לחפש באינטרנט מידע לגבי האנשים שעל שם נקראים הסולמות השונים למדידת טמפרטורה.		הנחיות קצרות לעבודה עם המשימה
בעיית הקובעים נועדה לעורר סקרנות אצל התלמידים. יש להציגו לפני הכל הכתיבה לפני תיאור הסיטואציה. לא הכרחי לעונת עליה. בסוף ניתן לחזור לשאלה זו.  עבודה בקבוצות של 2-4 תלמידים.  לפתרון הבעיה ניתן להיעזר בישום מודולרי.  בדיון הכתתי אפשר להציג את היישום הנוסף הממחיש את הקשרים בין הסולמות השונים למדידת טמפרטורה.  ניתן לבקש מהתלמידים לחפש באינטרנט מידע לגבי האנשים שעל שם נקראים הסולמות השונים למדידת טמפרטורה.		
בעיית הקובעים נועדה לעורר סקרנות אצל התלמידים. רצוי להציגו לפני הכל הכתיבה לפני תיאור הסיטואציה. לא הכרחי לעונת עליה. בסוף ניתן לחזור לשאלה זו.  עבודה בקבוצות של 2-4 תלמידים.  בדיון הכתתי יש לאפשר לתלמידים להציג דרכי שונות לפתרון.  בדיון זה ניתן להציג את היישום המודולרי לצורך הממחשת הקשרים הקיימים בין הסולמות השונים למדידת טמפרטורה.  ניתן לבקש מהתלמידים לחפש באינטרנט מידע לגבי האנשים שעל שם נקראים הסולמות השונים למדידת טמפרטורה וכן לחפש הסברים לפי אילו עקרונות נקבעו הסולמות השונים.		



## משימה - מדידת טמפרטורה בסולמות שונים



בבית הכבאים

ערן ומיכל נוהגים להסתבל במד-חום לפני שהם יוצאים החוצה.

מיכל יצא החוצה לקניות, כשהטמפרטורה בחוץ היא 25 מעלות.

היא לובשת שמלה nisi ללא שרוולים וכובע קש עם פרח.

גם ערן יצא החוצה עם כלבו, כאשר הטמפרטורה בחוץ היא 25 מעלות.

הוא לובש מעיל חם וכובע צמר עם פונפון.

בצד זה יכול ל��ות? הסבירו תשובהכם.

### טיור סיטואציה

בישראל נהוג למדוד טמפרטורה במעלה צלזוס °C. בארה"ב נהוג למדוד טמפרטורה במעלה פרנהייט °F.

במדוע נהוג למדוד טמפרטורה במעלה קלוין K.

לפניכם (בעמוד הבא) מדוי טמפרטורה (מדי-חום) מסוימים. בתמונה 1 מד-טמפרטורה המודד טמפרטורה במעלה צלזוס (C) ובמעלה פרנהייט (F). בתמונה 2 מד-טמפרטורה המודד טמפרטורה במעלה צלזוס (C) ובמעלה קלוין (K).


האפס המוחלט שווה ל-  $-A0$  (אפס מעלות קלוין).

את הטמפרטורה הנמוכה ביותר ניתן למדוד החוקר להביא חומר לאפס המוחלט, אך ניתן לשאוף אליו.

הבריטי וליאם תומפסון הידוע כלורד קלוין בשנת 1848.



תמונה 2



תמונה 1

### פתרו את הבעיה הבאה

התבוננו בתמונות של מדי הטמפרטורה (mdi-החום) השונים וענו על השאלות הבאות:

- אם הטמפרטורה עולה ב-  $10\text{ K}$  בכמה מעלות פרנהייט תעלה הטמפרטורה? פרטו חישוביכם.
- מצאו בכמה מעלות שווה האפס המוחלט במלואות צלזוס? במלואות פרנהייט? פרטו חישוביכם.
- מצאו ביטוי לפונקציית המרת מילויון למלואות פרנהייט. פרטו חישוביכם.
- האם תיתכן טמפרטורה של  $\text{F}^{\circ} - 400$  – ? ושל  $\text{F}^{\circ} - 500$  – ? הסבירו תשובתכם.

### מקורות

תמונה 1: iStock-147758590

תמונה 2: [ויקיפדיה](#)

האפס המוחלט: [מבחן דיזנסון](#)



## פתרונות אפשריים

א. מתרמונה 2 ניתן להסיק שעלייה ב-  $10K$  מתאימה לעלייה ב-  $-10^{\circ}\text{C}$ , מתרמונה 1 ניתן להסיק שעלייה ב-  $-10^{\circ}\text{C}$  מתאימה לעלייה ב-  $-F18$ . לכן עליה ב-  $10K$  מתאימה לעלייה ב-  $-18^{\circ}\text{F}$ .

ב. נוסחת ההמרה ממעלות צלזוס למעלות פרנהייט היא  $y_F = 1.8x_C + 32$   
 $(\text{בתמונה 1 בולט ש}-40^{\circ}\text{F} = -40^{\circ}\text{C})$ .

ג. נוסחת ההמרה ממעלות צלזוס לקלוין היא  $y_K = x_C + 273$   
 על ידי הצבה בנוסחאות ההמרה מתקבלות התשומות הבאות:

$$0K = -459.4^{\circ}\text{F} = -273^{\circ}\text{C} = -459.4^{\circ}\text{C}$$

דרך נוספת לפתרון סעיפים א, ב, ג

בנייה טבלת ערכיים משותפת. לדוגמה:

מעלות פרנהiteit (F)	מעלות צלזוס (C)	קלוין (K)
$32^{\circ}\text{F}$	$0^{\circ}\text{C}$	$273 K$
$50^{\circ}\text{F}$	$10^{\circ}\text{C}$	$283 K$
$68^{\circ}\text{F}$	$20^{\circ}\text{C}$	$293 K$
$86^{\circ}\text{F}$	$30^{\circ}\text{C}$	$303 K$

ניתן להסיק שהקשר בין מעלות קלוין למעלות פרנהייט הוא קשור לינארי.

כasher הטמפרטורה עולה ב-  $10K$  הטמפרטורה עולה ב-  $-F18$ . לכן שיפוע הפונקציה הקווית הוא  $1.8$ ,

פונקציית ההמרה (או נוסחת ההמרה) מקלוין לפרנהייט היא:  $y_F = 1.8x_K - 459.4$

או

על פי הנוסחאות שנמצאו בסעיף ב:

$$y_F = 1.8(y_K - 273) + 32 \quad , \quad y_K - 273 = x_C$$

לכן:  $y_F = 1.8x_K - 459.4$  בلمור  $y_F = 1.8y_K - 459.4$


ד. טמפרטורה של  $F400$  – אפשרית כי בקלוין הטמפרטורה היא חיובית:  $K33$ .

טמפרטורה של  $F500$  – לא אפשרית כי בקלוין הטמפרטורה היא שלילית:  $K22.56$  – ובקלוין לא תתקן טמפרטורה שלילית.

או: מצאנו שהאפס המוחלט שווה ל-  $-F459.4$ , טמפרטורה גבוהה מזו אפשרית, וגובהה מזו אינה אפשרית.



## משימה - מדידת טמפרטורה בסולמות שונים



בattività הכוכבים

ערן ומיכל נוהגים להסתבל במד-חום לפני שהם יוצאים החוצה.

מיכל יצא החוצה לקניות, כשהטמפרטורה בחו"ז היא 25 מעלות.

היא לובשת שמלה משי ללא שרוולים וכובע קש עם פרח.

גם ערן יצא החוצה עם כלבו, כאשר הטמפרטורה בחו"ז היא 25 מעלות.

הוא לובש מעיל חם וכובע צמר עם פונפון.

בצד זה יכול ל��ות? הסבירו תשובהכם.

### טיור סיטואציה

בישראל נהוג למדוד טמפרטורה במעלות צלזיוס °C. בארה"ב נהוג למדוד טמפרטורה במעלות פרנהייט °F.


במדוע נהוג למדוד טמפרטורה במעלות קלוין K.

לפניכם (בעמוד הבא) מדוי טמפרטורה (מד-חום) מסוימים. בתמונה 1 מד-טמפרטורה המודד טמפרטורה במעלות צלזיוס (C) ובמעלות פרנהייט (F). בתמונה 2 מד-טמפרטורה המודד טמפרטורה במעלות צלזיוס (C) ובמעלות קלוין (K).

האפס המוחלט שווה ל-  $-A0$  (אפס מעלות קלוין). האפס המוחלט הוא הטמפרטורה הנמוכה ביותר. לא ניתן להביא חומר לאפס המוחלט, אך ניתן לשאוף אליו. את הטמפרטורה הנמוכה ביותר הצליח למדוד החוקר הבריטי ווליאם תומפסון הידוע כlord קלוין בשנת 1848.



תמונה 2



תמונה 1

## פתרו את הבעיה הבאה

### סעיף I

התבוננו בתמונות של מד-הטמפרטורה ובארבעת הגרפים הנתונים בעמוד הבא.

כתבו איזה גרף מבין ארבעת הגרפים, הנתונים בהמשך, מבטא:





- המרה ממעלות צלזיוס למעלה פרנהייט
- המרה ממעלות פרנהייט למעלה צלזיוס
- המרה ממעלות צלזיוס לקלווין
- המרה מקלוין למעלה צלזיוס

ນמקו תשובהיכם. תוכלו להיעזר בישומון המצורף

הערה: לא לכל הסעיפים למעלה ישנו גרף מתאים.

### סעיף II

מצאו לבמה מעלות שווה האפס המוחלט במעלה צלזיוס? במעלה פרנהייט? פרטו חישוביכם.



## מקורות

תמונה 1: [iStock-147758590](#)

תמונה 2: [ויקיפדיה](#)

הafs המוחלט: [מבחן דיזנסן](#)



## פתרונות אפשריים

### סעיף I

גרף ב מותאים לפונקציית המרה ממעלות פרנהייט למלות צלזוס.

גרף ג מותאים לפונקציית המרה ממעלות צלזוס לקלוין.

גרף ד מותאים לפונקציית המרה ממעלות צלזוס למלות פרנהייט.

### סעיף II

מתמונה 2 ומגרף ג ניתן להסיק שעלייה ב-  $10K$  מתאימה לעלייה ב-  $-10^{\circ}C$ , מתמונה 1 ומגרף ד ניתן להסיק שעלייה ב-  $-10^{\circ}C$  מתאימה לעלייה ב-  $18^{\circ}F$ . לכן עליה ב-  $10K$  מתאימה לעלייה ב-  $-18$  מלות פרנהייט.


נוסחת ההמרה ממעלות צלזוס למלות פרנהייט היא  $32 =$

(בתמונה 1 בולט ש-  $-40^{\circ}F = -40^{\circ}C$  ).

נוסחת ההמרה ממעלות צלזוס לקלוין היא  $y_K = x_C + 273$ . על ידי הצבה בנוסחאות ההמרה מתקבלות התשומות הבאות:  $0K = -459.4^{\circ}F = -459.4^{\circ}C = -273^{\circ}C = -273^{\circ}F$  – ולכן



## משימה - מדידת טמפרטורה בסולמות שונים



**בעית הכוכבים**

ערן ומיכל נוהגים להסתבל במד-חום לפני שהם יוצאים החוצה.

מיכל יוצאת החוצה לקניות, כשהטמפרטורה בחו"ז היא 25 מעלות.

היא לובשת שמלה nisi לא שרוכים וכובע קש עם פרח.

גם ערן יוצא החוצה עם כלבו, באשר הטמפרטורה בחו"ז היא 25 מעלות.

הוא לובש מעיל חם וכובע צמר עם פונפון.

בצד זה יכול לקרות? הסבירו תשובהכם.

### טיור סיטואציה


בישראל נהוג למדוד טמפרטורה במעלות צלזיוס °C. בארה"ב נהוג למדוד טמפרטורה במעלות פרנהייט °F. במדוע נהוג למדוד טמפרטורה במעלות קלוין K.

לפניכם (בעמוד הבא) מדוי טמפרטורה (מד-חום) מסווגים שונים. בתמונה 1 מד-טמפרטורה המודד טמפרטורה במעלות צלזיוס (C) ובמעלות פרנהייט (F). בתמונה 2 מד-טמפרטורה המודד טמפרטורה במעלות צלזיוס (C) ובמעלות קלוין (K).

האפס המוחלט שווה ל- 0 (אפס מעלות קלוין). האפס המוחלט הוא הטמפרטורה הנמוכה ביותר. לא ניתן להביא חומר לאפס המוחלט, אך ניתן לשאוף אליו. את הטמפרטורה הנמוכה ביותר הצליח למדוד החוקר הבריטי וליאם תומפסון הידוע כlord Kelvin בשנת 1848.



תמונה 2



תמונה 1

### פתרו את הבעיה הבאה

א. התבוננו בתמונות של מדי הטמפרטורה (mdi-החום) והשלימו את הטעלה:

טמפרטורה ב- $^{\circ}\text{F}$	טמפרטורה בקלוין K	טמפרטורה ב- $^{\circ}\text{C}$

תוכלו להיעזר ביצירתם המצורף

ב. מצאו כמה מעלות שווה האפס המוחלט במלואות צלזוס? במלואות פרנהייט? פרטו חישוביכם.

### מקורות

תמונה 1: iStock-147758590

תמונה 2: [ויקיפדיה](#)

האפס המוחלט: [מבחן דיזנסון](#)



## פתרונות אפשריים

א. בניית טבלת ערכים משותפת. לדוגמה:

מעלות פרנהייט (F)	מעלות צלזיוס (C)	קלוין (K)
32°F	0°C	273 K
50°F	10°C	283 K
68°F	20°C	293 K
86°F	30°C	303 K

ב. בעזרת הטבלה ניתן למצוא את הנוסחאות לפונקציות הלינאריות (על פי שני נקודות או שיפוע ונקודה)

$$y_K = x_C + 273$$

$$y_F = 1.8x_C + 32$$

$$0 \text{ K} = -459.4^\circ\text{F} - 273^\circ\text{C} = -459.4^\circ\text{F} , -273^\circ\text{C} = 0 \text{ K}$$